

MALATTIE VENEREE O SESSUALMENTE TRASMISSIBILI (MST)

Ogni anno in tutto il mondo, escludendo l'AIDS, **330 milioni di persone** contraggono una malattia a trasmissione sessuale. Alcune di queste malattie (candida, clamidia, sifilide) aumentano consistentemente il rischio di trasmissione dell'AIDS.

Uno dei gruppi di persone più a rischio nel mondo è quello degli **adolescenti**. Dei 333 milioni di nuovi casi per MST stimati ogni anno, circa 111 interessano i giovani al di sotto dei 25 anni.

Le **ragazze** sono più vulnerabili dei ragazzi per ragioni fisiologiche ma anche sociali.

Più della metà delle nuove infezioni AIDS ogni anno interessano giovani nel gruppo di età di 15-24 anni.

Contrarre un'infezione sessuale in una donna durante la gravidanza può avere conseguenze molto negative per il feto, fino alla morte in utero dello stesso. Oltre alla contrazione della malattia, possono verificarsi danni neurologici, infezione agli occhi, polmoniti, epatiti acute, meningiti, malattie croniche del fegato, cirrosi, anomalie congenite (cecità, sordità, danni ad altri organi). La diagnosi di un'infezione MST è più problematica in adolescenza perché la malattia può essere asintomatica.

Le malattie sessualmente trasmissibili più importanti sono **AIDS, sifilide, gonorrea, clamidia**; le più diffuse sono la tricomoniasi (120 milioni di casi), infezioni da Clamidia (50 milioni) e da Gonorrea (25 milioni).

Tali malattie si trasmettono durante i rapporti sessuali attraverso il contatto delle mucose con liquidi organici infetti (sangue, sperma e secreti vaginali). Alcune malattie veneree, in particolare le infezioni da *herpes*, sono trasmissibili anche attraverso i rapporti orali, baci e petting.

Il **preservativo** è **essenziale** per evitare il contagio!